



PENİSE HİYALURONİK ASİT DOLGU İŞLEMİ HASTA AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

HASTA ADI SOYADI:
PROTOKOL NO:

11 Nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı, “Tababet ve Şuabatı San”atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun”un 70.maddesi ve 01 Ağustos 1998 tarihinde yayınlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği”nin 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı yönetmelikle değiştirilen 26. maddesi uyarınca tıbbi, invaziv ve cerrahi müdahaleler öncesinde hastaya ya da kanuni temsilcisine imzalatılması gereken “Rıza Formu”dur.

Sayın hastamız, lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz.

- Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen girişim / tedavi hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. • Bu açıklamaların amacı, sağlığınız ile ilgili konularda alınacak kararlara sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir.
- Tanısal girişimlerin, tıbbi ve cerrahi tedavilerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek kendi kararınıza bağlıdır.
- Onay veriyorsanız, bu dokümanın en son bölümde oluşturulmuş alanı imzalayınız ve el yazınızla rıza belgesini doldurunuz. • Girişim / tedavi için onam belgesini imzalarsanız bile; istediğiniz zaman bu onamınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Ancak; unutmamalısınız ki, “yasal açıdan” onamınızı girişim başladıktan sonra geri almanız, ancak tıbbi yönden sakınca bulunmaması şartına bağlıdır • Burada belirtilenlerden başka sorularınız varsa bunları yanıtlamak görevimizdir.

Bu bilgilendirilmiş hasta rıza formları; üroloji bilimsel literatürü ve kılavuzları incelenerek, uluslararası üroloji meslek derneklerinin hazırlamış olduğu hasta bilgilendirme broşürleri dikkate alınarak ve özellikle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış olan formlar baz alınarak hazırlanmıştır.



Giriş

Kliniğimizde bilgilendirilmiş rıza formları ameliyat randevusu verilirken size okumanız için teslim edilmektedir.

Bu rıza belgelerinde veya hastalığınızla özellikle planlanan ameliyatınızla ilgili anlamadığınız bir durum veya daha ayrıntılı açıklanmasını istediğiniz bir konu varsa mutlaka hekiminize sorunuz.

Hyaluronik Asit Nedir?

İnsan vücudundan yaklaşık 15 g civarında bulunan, cilde esneklik, hacim ve nemlilik sağlayan, eklem aralıklarında kayganlık veren ve göz içerisinde de yoğun miktarda bulunan organik bir glikozaminoglikan bileşiğidir.

Hangi Hyaluronik Asit Kullanıyoruz?

Penis başı dolgu işleminde kullandığımız hyaluronik asit insan vücuduna uyumlu ve doğal yoldan yıkılarak uzaklaştırılabilen bakteri fermantasyonu ile üretilen bir üründür. ***Bu ürün erkek genital bölgesi için lisanslı genital bölge dokusu ile uyumlu en güvenilir hyaluronik asit materyalidir. Biz de kliniğimizde yalnızca bu ürünleri kullanmaktayız.***

Neden Hyaluronik Asit Kullanıyoruz?

Yapılan çalışmalar penis başı (glans penis) için tek güvenilir dolgu maddesi olarak hyaluronik asiti önermektedir. Penis kalınlaştırma işlemlerinde kullanılan biouyumluluk ve biodegradasyon açısından entatmin edici sonuçlar da yine hyaluronik asit ile sağlanmıştır. Diğer dolgu materyalleri ile ilgili ciddi komplikasyonlar bildirilmiştir.

Ne Kadar Hyaluronik Asit Uyguluyoruz?

Hastanın penis ve glans boyutuna göre değişmekle beraber, penis için 12-15 cc, glans için 2-3 cc hyaluronik asit uygulaması gerçekleştiriyoruz. Size uygulanacak olan miktar doktorunuz tarafından anatominize en uygun şekilde belirlenecektir.

İşlem Ne Kadar Sürer?

Kişiden kişiye değişmekle birlikte, anestezi ile birlikte toplam işlem süresi 30 dk civarındadır. İşlemden sonra günlük yaşamınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Günlük yaşamınızı kısıtlayacak bir durum söz konusu değildir.



İşlem Sırasında Ağrı Hissedecek Miyim?

İşlemden 10 dk önce penisiniz lokal anestezi ile tamamen uyuşturulacaktır. Bu nedenle işlem esnasında ağrı duymayacaksınız. İşlem bittikten sonra da ağrı şikayeti kabul edilir düzeyde olacaktır. Gerek duymanız halinde doktorunuzun önerdiği ağrı kesiciyi alabilirsiniz.

İŞLEMİN RİSKLER NELERDİR?

Enfeksiyon: Genel prensip olarak herhangi bir maddenin vücuda enjeksiyonu, enfeksiyon riskini taşır. Bu risk özellikle genital organlara yapılan işlemlerde daha yüksektir. İşlem öncesi doktorunuz enjeksiyon yapılacak bölgeyi muayene eder. Ciltte bir enfeksiyon var ise işlemi yapmaz. Enfeksiyon belirtisi olmayan alan steril edildikten sonra enjeksiyon işlemi tamamlanır. Yine doktorunuz uygun gördüğü durumda size antibiyotik kullanmanızı önerebilir.

İşlem sonrası lütfen klinikte size verilen talimatlar uyguladığınızdan emin olun. Bir enfeksiyondan şüpheleniyorsanız mümkün olan en kısa sürede doktora başvurun. Aşağıdaki enfeksiyonla ilgili ek bilgilere bakın. ***Aktif bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyonunuz veya idrar yolu enfeksiyonunuz varsa doktorunuza bildirin ve işlemi erteleyin.***

Alerji: Hiyaluronik asite karşı alerjik reaksiyon nadirdir ve genellikle hafiftir. Alerjik reaksiyon ciltte döküntü şeklinde ortaya çıkabilir. Alerjik reaksiyon meydana gelirse öncelikle antihistaminik ilaçla tedavi gerekli olabilir. Bu tedavi yeterli olmaz ise hiyaluronidaz ile dolgunun bir kısmının veya tamamının erimesi gerekebilir.

Düzensizlikler: Dolgu ilk hafta hasta tarafından şekillendirilebilir. Gerekliğinde sonucun iyileştirilmesi için ilave dolgu maddesi eklenebilir. Ancak bazı durumlarda tüm düzensizlikleri ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir ve bu tür düzensizliklerin veya topakların Hyaluronidaz (çözünür) enzimiyle tedavi edilmesi gerekebilir (yalnızca Hyaluronik asit dolgular için geçerlidir). ***Ancak bu tedavi ile bile topaklar geçmeyebilir ve peniste şekil bozukluğu kalıcı olabilir.***

Yanlış beklentiler: Örneğin; bir hasta, penisinin boyutunu çok küçükten çok büyüğe, sadece az miktarda dolgu maddesiyle değiştirmenin mümkün olduğunu düşünebilir. Bir hasta, beklenen bir sonuç olmadığı halde, bu işlemin ereksiyon halindeki penis uzunluğunu arttıracığı şeklinde yanlış bir inancıya sahip olabilir.

Penis başı dolgu işlemindeki amaç penis dermal tabakası altında bir bariyer oluşturarak sinir uyarımını azaltıp erken boşalmayı önlemek, geciktirmektir. Penis gövdesine ve başına hacim ve kalınlık kazandırmak için de hiyaluronik asit ile dolgu işlemi yapılmaktadır. ***Bu işlem sonrasında penis boyunda uzama beklenmez.*** Hyaluronik asit ile yapılan tüm işlemler geri dönüşümlüdür. ***Hyaluronik asit 6 ay ile 12 ay içerisinde eriyerek kaybolacaktır.***

Uyuşma: Penisin özellikle dorsal (üst) tarafında birkaç gün boyunca uyuşukluk hissedilebilir. Penisteki uyuşukluk hissi kısa süreli geçici bir durumdur.



Ağrı: Kullanılan dolgu türüne bağlı olarak işlem sonrasında penis 1 hafta kadar hassas olabilir.

Şişlik: Şişliğin inmesi genellikle 2 hafta kadar sürer. Çok miktarda dolgu maddesi enjekte edilirse veya vücut buna ciddi bir şişlikle tepki verirse, bunun tamamen kaybolması 1 ayı bulabilir.

Morarma: Bu hastadan hastaya önemli ölçüde değişir ve genellikle 1 hafta içinde düzelir. Nadir durumlarda morarma ve hematom(kan birikmesi) önemli olabilir.

Geç başlangıçlı iltihaplanma: Nadir durumlarda, peniste iltihaplanma işlemden aylar sonra ortaya çıkabilir ve bazı durumlarda dolgu maddesinin çözülmesini veya ek tedavinin yapılmasını gerektirebilir.

Dolgu maddesinin yer değiştirmesi: Dolgu maddesinin ilk enjekte edildiği bölgeden hareket etmesi mümkündür. Dolgu maddesinin enjekte edildikten sonraki ilk hafta, çevre dokuyla bütünleşmeden önce hareket etme olasılığı daha yüksektir. Penis gövdesini karın duvarına yaklaştıran hafif sıkı iç çamaşırları dolgunun kaymasını önleyebilir.

Dismorfi, akıl hastalığı, MSD, herpes, mikoz, klamidy enfeksiyonu gibi geçmiş herhangi bir idrar veya cinsel enfeksiyonun yanı sıra bağışıklık yetmezliği gibi bir öykünüz varsa doktorunuzu bilgilendirin.

Doktorunuz, geçmişte yapılan tüm ameliyatlar, tıbbi durumlar ve geçmişte gerçekleştirilen penis büyütme işlemlerinin ayrıntıları ve ayrıca aldığınız ilaçlar hakkında bilgilendirin.

Damar Sorunları: Oldukça nadir görülen bir sorun da hiyaluronik asitin damar içerisine girerek kama yapması ve buna bağlı doku hasarıdır. Bu durumda doktorunuz hiyaluronidaz enzimi ile müdahale ederek tıkanıklığı açacaktır. Tıkanıklık açılmadığı durumda doku harabiyeti gelişebilir.

Daha Önce Sünnet Olmayan Hastalar:

Penis başının yakınına çok fazla dolgu maddesi yerleştirilirse, bazı hastalarda sünnet derisinin geri çekilmesi daha zor olabilir. Özellikle sünnetsiz erkeklerde penis başına çok fazla hacimde dolgu verilmemelidir.

İlk muayene sırasında hafif ile şiddetli fimozisi olan hastalarda risk daha yüksektir (Fimosis, penisin sünnet derisinin penis başının ötesine çekilemediği bir durumdur).

Sünnetsiz hastalar penis kalınlaştırma amacıyla uygulanan dolgu maddesinin sünnet derisi bölgesine taşınması (migrasyon) riski vardır. Bu, sünnet derisi geri çekildiğinde görülebilen küçük dolgu topakları olarak ortaya çıkabilir.



İşlemden sonraki ilk 7 gün boyunca penisi destekleyici iç çamaşırı (külot) ile desteklenmiş halde tutun, böylece yer çekimi, yayılma ve yürümenin etkisi dolgu maddesinin aşağıya penis başına doğru hareket etmesine neden olmaz.

Sünnet derisinde aşırı dolgu fark ederseniz, penisin tabanına doğru masaj yapmayı deneyin. Eğer dolguyu aşağı itemezseniz, klinikte tekrar eritilmesi gerekebilir ve bunun sonucunda dolgunun küçük bir kısmını kaybedebilirsiniz.

GLANS PENİS DOLGU ENJEKSİYONU (Erken Boşalmanın Tedavisi için)

Erken boşalma tedavisinde penisin başının (glans) boyutunu arttırmak veya hassasiyetini azaltmak için dolgu enjekte edilebilir. Dolgu maddesinin penis başına enjekte edilmesi daha yüksek risk taşıyor ve özel bir Hiyaluronik asit dolgu maddesinin kullanılmasını gerektirir.

Penis gövdesine hiyaluronik asit uygulanmasına benzer riskleri içerir. Bu risklerden bazıları enfeksiyon, penis başında morarma, şekil bozukluğu, hafif kabarıkların oluşumu (papul) ve hassasiyetin yetersiz azalmasıdır (işlem başarısızlığı).

En güncel araştırmada erken boşalma için glans penis hiyaluronik asit enjeksiyonu uygulanan hastaların %67'sinde işlem başarılı olmuştur. Bu hastalarda ilişki süresinde işlem öncesine göre 2.6 kat uzama saptanmıştır.

Başarısız olunan hastalarda 1-3 ay içinde ikinci bir dolgu işlemi uygulanması gerekebilir. Bu sayede sinir tabakası üzerindeki dolgu miktarı artırılınca hassasiyet azalması mümkün olur. Glans penis üzerinde yüzeysel enjeksiyona bağlı papul oluşan hastalarda ikinci dokunuşlarla papul etrafına dolgu uygulanması ile düzeltme yapılabilir.



İŞLEM SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

1. İŞLEM DEN SONRAKİ 24 SAAT İÇERİSİNDE DUŞ ALMAYINIZ.
2. İŞLEM DEN SONRA DUŞ VEYA BANYO YAPARKEN ÇOK SICAK SU KULLANMAYINIZ. ILIK SU İLE CİNSEL ORGANINIZI NAZİKÇE SABUN VEYA JEL İLE YIKAYINIZ.
3. İŞLM SONRAKİ 1 AY HAMAM VEYA SAUNAYA GİRİLMESİNİ ÖNERMİYORUZ.
4. İŞLEM SONRASI İLK 24 SAAT İÇERİSİNDE 3 LİTRE SIVI TÜKETMENİZİ ÖNERİYORUZ.
5. İŞLEM DEN SONRAKİ 7 GÜN İÇERİSİNDE MASTURBASYON YAPMAYINIZ VE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYİNİZ.
6. PENİSİNİZDE RENK DEĞİŞİKLİĞİ, ANORMAL ŞİŞME, AĞRI VEYA SIRADIŞI BİR DEĞİŞİKLİK GÖRMENİZ VEYA HİSSETMENİZ DURUMUNDA MUTLAKA KLİNİĞİMİZLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
7. İŞLEM SONRASI DOLGUNUN BİR BÖLGEDE BİRİKMESİ, PENİSTE ŞEKİL BOZUKLUĞU OLURSA DOKTORUNUZA DANIŞIN.

Yukarıda anlatılan olası sorunları detaylı olarak okudum anladım, işlem sonrası önerileri yapmayı kabul ederek işlemin yapılmasını onaylıyorum.

Doktorum tarafından olası riskler konusunda bilgilendirme sözel olarak yapıldı, olası riskler konusunda bilgi aldım. Aklımdaki soruları sormak için yeterli zamanım oldu, tatmin edici cevaplar aldım.

TARİH:
HASTA ADI:
İMZA:

TARİH:
DOKTOR ADI:
İMZA: